

	Dokumentets Titel <b>ANAFYLAXI – BASAL BEHANDLING</b>	
Framtaget av (förf) Ann-Sofie Enlund, Jan Svedmyr, Hans Matsols	Dokumentkategori PM	Version
Gäller för: Landstinget Dalarna	Godkänt av Åsa Blomberg	Gäller 20090401 - 20120331

## ANAFYLAXI - BASAL BEHANDLING

### Symtom, svårighetsgradering. Snabb symtomutveckling allvarligare

Klåda, flush, urtikaria, angioödem. Rinit. Konjunktivit. Munklåda, läppsvullnad. Lindrig buksmärta, enstaka kräkning	Ej anafylaxi
Lindrig bronkobstruktion. Heshet. Tachycardi. Ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré. Trötthet, rastlöshet, oro.	<b>Anafylaxi Grad1</b> Lindrig
Medelsvår bronkobstruktion, skällhosta. Sväljningsbesvär. Svimmingskänsla, katastrofkänsla	<b>Grad 2</b> Medelsvår
Svår bronkobstruktion, hypoxi, cyanos. Andningsstopp. Lågt blodtryck, bradykardi, arytm. Hjärtstopp. Urin och faecesavgång. Förvirring. Medvetlöshet.	<b>Grad 3</b> Svår

Indikation	Läkemedel	Adm.sätt	Dos vuxna	Dos barn	
Kraftig urtikaria Andnöd Hypotension Allmänpåverkan	<b>Adrenalin 1 mg/ml</b> eller <b>Anapen</b>	<b>intra- muskulärt</b> i låret	0,3 ml  Anapen (0.3 mg)	0,01 ml/kg 10 –20 kg Anapen junior (0,15mg) >20 kg Anapen (0,3 mg)	Effekt inom 5 min Upprepa vb var 10:e min
Astma	<b>Buventol</b> Easyhaler 200 mg eller annan bronkvidgande	inhalation	4-6 doser	1-3 doser	Effekt inom 5 min. Upprepa vb var 10:e min
Alla	<b>Aerius</b> <b>2,5 mg tabl</b> <b>munsönderfallande</b> eller annat antihistamin i dubbel dos	läggs i munnen	4 tabl	< 6 år 1 tabl 6-12 år 2 tabl >12 år 4 tabl	Effekt efter 30-60 min
Alla	<b>Betapred</b> tabl 0,5 mg	löses i vatten eller tuggas och sväljs	10 tabl	< 6 år 6 tabl >6 år 10 tabl	Effekt efter 2-3 tim

- Dokumentera reaktionen och tidsförloppet.
- Vid anafylaxi ska patienten observeras på sjukhus.
- Efter anafylaxi remiss till allergimottagning för uppföljning.
- Varningmärk journal vid medelsvår till svår reaktion med säkerställd orsak.