


| | | |
|--|--|---|
|  <p>Landstinget DALARNA Smittskyddsläkaren</p> <p>Ägare: Smittskyddsenheten</p> | <p>Dokumentets Titel Hälsundersökning av migranter (asylsökande, flyktingar m.fl.)</p> | |
| <p>Framtaget av (förf)</p> <p>Anders Lindblom</p> | <p>Dokumentkategori:</p> <p>PM</p> | <p>Version</p> <p>3</p> |
| <p>Gäller för:</p> <p>Landstinget Dalarna</p> | <p>Godkänt av Anders Lindblom</p> | <p>Gäller fr.o.m. – t.o.m. 2012-02-01 – 2015-12-31</p> |

Åtgärder motiverade av smittskyddsskäl

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd "Hälsundersökning av asylsökande m.fl., SOSFS 2011:11" förklarar hälso- och sjukvårdens åtaganden. Av författningen framgår att alla asylsökande m.fl. så snart som möjligt efter ankomsten bör erbjudas en individuell hälsundersökning. Som del i hälsundersökningen sker provtagning och kroppsundersökning. Undersökningarna sker oberoende av besked om uppehållstillstånd. I kallelsen till hälsundersökning skall anges syftet med hälsundersökningen, att hälsundersökningen är frivillig, att tolk kommer att anlitas vid behov och kontaktuppgifter till den mottagning som ska göra hälsundersökningen. Erbjudandet bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår. Om erbjudandet inte uppmärksammas ska påminnelse göras och bör upprepas minst en gång.

Mer information finns på [Socialstyrelsen hemsida](#).

Kroppsundersökning och provtagning bör individualiseras utifrån aktuell situation och uppgifter från hälsosamtal.

Rekommenderad provtagning (=screeningundersökning)

| <u>Smittämne/Sjukdom</u> | <u>Målgrupp (ålder)</u> | <u>Undersökning</u> |
|---|--|---|
| HIV | Alla | HIV (combotest) |
| Hepatit B | Alla | HBsAg (serologi) |
| Syfilis | Alla | VDRL/TPPA (serologi) |
| Röda hund (rubella) | Endast gravida | Serologi |
| Giardiasis | Barn < 6 år | Faeces-mikroskopi ("cystor & maskägg") |
| Tuberkulos* Anamnes/Hälsodeklaration | Personer som kommer från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa | Hälsodeklaration (se SoS-dokument*). Tidigare haft tbc, hosta, avmagering, nattsvettning, bröst/ryggsmärtor, hud/mjukdelssvullnad |
| PPD och/eller IGRA | Personer som kommer från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa | Intrakutan tuberkulintest eller IGRA (Quantiferontest) |
| Lungröntgen | 1. Alla barn enligt ovan < 5 år (oavsett PPD) 2. De enligt ovan som har PPD \geq 10 mm. | Lungröntgen (viktigaste metod för att hitta smittsam lung-tbc) |
| Bakteriell tarminfektion | Endast vid diarré | Faecesodling |
| Hudinfektion | Endast vid sår | Allmän odling (frågeställning MRSA) |

* [Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, jan 2007](#)

Ytterligare prover som kan bli aktuella efter de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet är:

- Blodstatus
- Blodsocker
- Faeces-mikroskopi ("cystor & maskägg")
- Urinprov
- PKU
- S-ALAT
- Hepatit A
- Hepatit C
- Bärarskap av multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE)