

Gonorré, patientinformation, 2010-02-15

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Du har blivit smittad (eller misstänks ha blivit smittad) med gonorré. Gonorré orsakas av en bakterie som bland annat smittar vid samlag. Den finns i urinröret och hos kvinnor även i slidan. Gonorré kan ge flytningar från urinröret och/eller slidan, men man kan vara smittad utan att ha några besvär.

Infektionen behandlas med antibiotika och om det sker snabbt efter smittotillfället är risken mycket liten för följsjukdomar. Det är viktigt att du tar antibiotikakuren på det sätt som din läkare förklarar. Vissa gonorrébakterier är okänsliga för den antibiotikabehandling (tabletter) man vanligen ger. I dessa fall behöver man därför ibland ge antibiotika i form av sprutor. Behandling av gonorré är kostnadsfri för patienten.

Kvinnor som bär på gonorrébakterien utan att ha fått korrekt antibiotikabehandling kan få äggledarinflammation med risk för bestående skador på äggledarna med efterföljande sterilitet. Män kan få inflammation i bitesticklarna, vilket i ovanliga fall kan leda till sterilitet. Gonorrébakterien kan även orsaka ögoninfektioner. Det förekommer, men är ovanligt, att bakterien tar sig in i blodet och ger allmän blodförgiftning.

Gonorré kan överföras vid samlag (i slida eller ändtarm) och vid andra sexuella aktiviteter som t ex petting och munsex. Överföring kan också ske från mor till barn vid förlossningen.

Många har gonorré utan att veta om det och det kan leda till problem senare i livet. Därför är det viktigt att de som du haft samlag eller annan intim kontakt med och som kan ha smittat dig – eller som du kan ha smittat – blir smittspårade och kommer till läkare för undersökning och information. Oftast ges då antibiotikabehandling redan vid misstanke om smitta. Full sekretess gäller vid smittspårningen och din identitet kommer inte att avslöjas för kontakterna.

Om provresultatet visar att du är smittad med gonorré, är du skyldig att medverka vid smittspårning.

För att förhindra att andra smittas måste du följa dessa förhållningsregler:

- *Om du har samlag eller annan intim kontakt innan du tagit hela antibiotikakuren eller det inte gått tio dagar sedan du påbörjade behandlingen, måste du innan ni har sex informera din partner om att du är smittad med gonorré. Ni måste då också använda kondom/femidom/slicklapp under hela samlaget/den intima kontakten.*
- *Du måste komma på de återbesök som din behandlande läkare anser nödvändiga.*

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det ska smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.

Smittskyddsläkarens adress:
Smittskyddsenheten
Falun lasarett
791 82 FALUN