

 <p>Landstinget DALARNA</p> <p>Ägare: Kliniken för Reumatologi</p>	Imurel / Azatiopriion	
<p>Framtaget av (förf) Per-Johan Hedin, Maria Strinnö</p>	<p>Dokumentkategori: Patientinformation</p>	<p>Version 4</p>
<p>Gäller för: Kliniken för Reumatologi Falu lasarett</p>	<p>Godkänt av Helena Hellström</p>	<p>Gäller fr.o.m. – t.o.m. 2010-01-01 – 2013-12-31</p>

Imurel / Azatiopriion

VARFÖR SKA JAG TA IMUREL? Det är ett läkemedel som på lång sikt kan minska sjukdomens inflammatoriska aktivitet och därmed lindra t ex stelhet och värk.

VAD ÄR IMUREL? Imurel är ett läkemedel som har flera användningsområden. Bland annat kan vissa reumatiska sjukdomar behandlas med Imurel. Exempel på sådana reumatiska sjukdomar är kronisk ledgångsreumatism (RA) samt SLE. Vid ledgångsreumatism aktiveras olika typer av blodceller som utsöndrar skadande ämnen. Dessa startar den reumatiska inflammationen. Imurel begränsar denna process orsakad av blodcellerna.

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN MEDICINEN FUNGERAR? Effekten av Imurel kommer i regel efter 2-3 månader. Vid ledgångsreumatism kan effekten vara t ex att lederna blir mjukare och mindre svullna.

HUR MÅNGA TABLETTER SKA JAG TA VARJE DAG? Det är mycket viktigt att ta tablettarna precis som Din läkare har ordinerat. Behandlingen brukar börja med 1-3 tabletter per dag. Tablettarna bör sväljas hela och kan tas tillsammans med mat.

HUR LÄNGE KAN JAG TA IMUREL? Efter hand som behandlingen fortskrider kan dosen komma att ändras. Din läkare provar ut vilken dos som är bäst just för Dig. Så länge tablettarna hjälper och Du mår bra kan Du fortsätta att ta medicinen.

HUR OFTA BEHÖVER JAG GÅ PÅ KONTROLL? Du träffar Din läkare regelbundet under hela behandlingsperioden. Prover lämnar Du var annan vecka under de första tre månaderna, och sedan var tredje månad.

FINNS DET NÅGRA BIVERKNINGAR AV IMUREL? Liksom alla läkemedel kan även Imurel ge oönskade effekter. Vår erfarenhet är att den vanligaste biverkningen är obehag från magen, och att mindre vanliga biverkningar är t ex påverkan på blodet, feber, hudutslag, och håravfall. När Du behandlas med den här medicinen får Du hela tiden regelbundet ta blodprover samt gå på kontroll hos Din läkare. Dessa prover tas för att följa upp behandlingens effekt och tidigt fånga upp eventuella biverkningar. Det är viktigt att Du kontaktar Din läkare om Du märker några symtom som Du misstänker beror på medicineringen.

KAN JAG TA ANDRA LÄKEMEDEL TILLSAMMANS MED IMUREL? Du ska fortsätta att ta Dina övriga mediciner så länge Din läkare inte säger något annat. Det är dock mycket viktigt att Du talar om vilka andra mediciner Du använder. Det gäller även sådana som inte är mot den reumatiska sjukdomen, och sådana som Du inte köpt på apoteket utan i hälsokostaffär eller i snabbköpet, t ex vitaminpreparat. Speciellt viktigt är det att Du berättar om Du använder läkemedlet Allopurinol, eller Zyloric (allopurinol) mot gikt. Allopurinol och Imurel påverkar nämligen varandra vilket måste beaktas när dosen av Imurel bestäms.

GRAVIDITET OCH AMNING. Kan användas under graviditet under kontroll. Passerar i liten mängd i bröstmjolk och ska bara användas under amning om starka speciella skäl föreligger.

NÅGRA ANDRA FRÅGOR? Tveka inte att fråga Din doktor om det är något Du undrar över.