

 <p>Landstinget DALARNA</p> <p>Ägare: <b>Kliniken för Reumatologi</b></p>	<p><b>Myocrisin - guldinjektioner</b></p>	
<p>Framtaget av (förf) <b>Per-Johan Hedin, Maria Strinnö</b></p>	<p>Dokumentkategori: <b>Patientinformation</b></p>	<p>Version <b>4</b></p>
<p>Gäller för: <b>Kliniken för Reumatologi Falu lasarett</b></p>	<p>Godkänt av <b>Helena Helström</b></p>	<p>Gäller fr.o.m. – t.o.m. <b>2010-01-01 – 2013-12-31</b></p>

## Myocrisin - guldinjektioner

### VARFÖR SKA JAG TA GULDINJEKTIONER?

Det är en medicin som på längre sikt kan minska reumatisk sjukdomen inflammatoriska aktivitet. Därmed lindras stelhet och värk och risken för bestående skador av sjukdomen minskar.

### VAD ÄR MYOCRISIN?

Myocrisin innehåller ämnet Natrium-aurothiomalat, som är ett guldsalt. Guld har använts som botemedel sedan urminnes tider. Sedan 1920-talet har behandling av reumatiska sjukdomar med guld visat sig ha effekt. Injektionsformen av guldsalt är form av läkemedlet som använts längst i behandlingen av reumatiska sjukdomar även om det numer även finns guldsalt i tablettform.

### HUR SKA JAG TA MYOCRISIN?

Myocrisin ges som en injektion intramuskulärt (i muskel). På reumatolog-kliniken eller på Din vårdcentral får Du hjälp med injektionerna. Doseringen är individuell. Sprutorna ges från början varje vecka, och sedan (efter ca ett halvt år) med längre tidsintervall.

### HUR LÅNG TID TAR DET INNAN MEDICINEN FUNGERAR?

De patienter som har nytta av Myocrisin känner som regel efter 3-4 månader en förbättring. Det kan dock ta både längre och kortare tid.

### HUR LÄNGE SKA JAG TA MYOCRISIN?

Efter hand som behandlingen fortskrider kan dosen komma att ändras. Din läkare provar ut vilken dos som är bäst just för Dig. Så länge medicineringen hjälper och Du mår bra kan du fortsätta med Myocrisin.

### FINNS DET NÅGRA BIVERKNINGAR AV MEDICINEN?

Liksom alla läkemedel så kan Myocrisin även ge oönskade effekter. Vanligast är hudutslag, eller klåda. Munslemhinnan kan irriteras och en metallisk smak kan uppkomma i munnen. Ofta kan biverkningar försvinna av sig själv utan att behandlingen behöver avbrytas.

Allvarligare men sällsynta biverkningar är påverkan på blod och njurar. När Du behandlas med Myocrisin får Du regelbundet ta blod- och urinprover samt gå på kontroll hos Din läkare. Dessa prover tas för att följa behandlingens effekt och tidigt fånga upp eventuella biverkningar. Kontakta din läkare om Du märker några symtom som Du misstänker beror på medicinen.

### KAN JAG TA ANDRA LÄKEMEDEL NÄR JAG TAR MYOCRISIN?

Du kan fortsätta att ta Dina övriga mediciner så länge din läkare inte säger något annat. Det är viktigt att Du talar om vilka andra mediciner Du använder.

### HUR OFTA SKA JAG GÅ PÅ KONTROLL?

Du träffar regelbundet Din läkare under hela behandlingsperioden. Prover tas efter ett bestämt schema.

**GRAVIDITET OCH AMNING?** Behandling med Myocrisin bör undvikas under graviditet och amning då erfarenheterna av sådan behandling ännu är begränsade.

### NÅGRA ANDRA FRÅGOR?

Tveka inte att fråga Din doktor om det är något Du undrar över.