

 <p>Landstinget DALARNA</p> <p>Ägare: Kliniken för Reumatologi</p>	Remicade	
<p>Framtaget av (förf) Per-Johan Hedin, Jörgen Lysholm</p>	<p>Dokumentkategori: Patientinformation</p>	<p>Version 4</p>
<p>Gäller för: Kliniken för Reumatologi Falu lasarett</p>	<p>Godkänt av Helena Hellström</p>	<p>Gäller fr.o.m. – t.o.m. 2010-01-01 – 2013-12-31</p>

Remicade

VARFÖR SKA JAG TA REMICADE?. Det är en medicin som kan lindra symtom vid reumatisk sjukdom som t ex stelhet och värk. Sjukdomens inflammatoriska aktivitet kan minska och ytterligare skadeverkningar på Dina leder då bromsas upp.

VAD ÄR REMICADE? Remicade tillhör en grupp läkemedel som kallas biologiska läkemedel. Dessa preparat framställs med genteknik och griper in i immunsystemets signalsystem. Remicade har förmågan att hämma verkningarna av signalämnet TNF, ett ämne som allmänt ökar inflammation. En hämning av TNF minskar inflammationens verkningar, inte bara svullnad, smärta och ömhet utan även trötthet och sjukdomskänsla. Preparatet måste ges som dropp, vanligen var annan månad. De första tre droppen ges med kortare intervall. Droppen ges på sjukhus. Besöket tar de första gångerna tre timmar men så småningom går det fortare, drygt en timme.

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN MEDICINEN FUNGERAR? De patienter som har nytta av Remicade känner ofta effekt redan efter 2-3 veckor och senast efter 3 månader behandling.

HUR LÅNGE KAN JAG TA REMICADE? Efter hand som behandlingen fortskrider kan intervallerna mellan droppen komma att förlängas. Din läkare provar ut vilken dos som är bäst just för Dig. Inför större operationer (t.ex. protesoperationer) med infektionsrisk rekommenderas uppehåll med medicinen i en vecka före och en till två veckor efter operationen. Vid infektioner med feber rekommenderas också ett tillfälligt uppehåll. Rutinmässigt penicillinskydd i samband med tandingrepp rekommenderas inte.

FINNS DET NÅGRA BIVERKNINGAR AV REMICADE? Den vanligaste biverkningen är olika slags obehag i samband med att droppet ges. Om du känner obehag, berätta det genast för sköterskan som hjälper dig med droppet. Remicade kan också ge ökad risk för infektioner. Oftast rör det sig då om övre luftvägsinfektioner som förkylning men också bihåleinfektioner. Du får hela tiden regelbundet gå på kontroll hos din läkare. Remicade kan genom sin speciella verkan minska de yttre tecknen på infektion så skärpt uppmärksamhet krävs. Vid infektionssymptom måste Du kontakta mottagningen.

KAN JAG TA ANDRA LÄKEMEDEL TILLSAMMANS MED REMICADE? Du kan fortsätta att ta Dina övriga mediciner så länge Din läkare inte säger något annat. Remicade kombineras ofta med Metotrexat. Levande vaccin får ej ges till en person som får Remicade. Rådgör med Din läkare om Du är osäker.

HUR OFTA BEHÖVER JAG GÅ PÅ KONTROLL? Du träffar regelbundet Din läkare under hela behandlingstiden.

GRAVIDITET. Under graviditet och amning ska inte Remicade användas.

NÅGRA ANDRA FRÅGOR? Tveka inte att fråga Din doktor om det är något Du undrar över. Vi är här för att hjälpa Dig och svarar gärna på frågor!