



Godkänt: 2018-05-03
Giltigt t.o.m: 2021-05-03

Ver.nr: 1.0
Dnr:

Ultraljud gallblåsa gallvägar remittent

Indikation/frågeställning

Undersökningen visar med stor säkerhet om konkret finns i gallblåsan eller ej. Däremot är säkerheten beträffande den eventuella förekomsten av konkret i gallgångarna lägre.

Undersökningen visar gallblåsans utseende och man kan med god säkerhet diagnostisera en akut gallblåseinflammation. Beträffande mer kroniska gallblåseförtjockningar kan det vara svårt att skilja mellan inflammatoriska förändringar och andra, t ex tumörförändringar. Det skall påpekas att ultraljudsundersökning är en avbildande undersökning som således inte ger någon större information om gallblåsans funktion.

Ultraljudsundersökning kan vidare påvisa en sjuklig vidgning av gallgångarna, då oftast beroende på avflödes hinder. Dettas natur kan också ofta bestämmas. På motsvarande sätt utesluter en normal ultraljudsundersökning i princip en extrahepatisk cholestas.

Kontraindikation

-

Remissinnehåll

-

Patientförberedelser

- Om pat skall undersöka gallblåsan skall hon vara fastande i minst 4 timmar. Detta är för att gallblåsan skall hinna fylla sig tillräckligt efter föregående måltid.
- Om endast gallvägarna skall undersökas (t ex cholecystektomerad patient) så skall pat fasta i 4 timmar, för att inte tarminnehåll, fr a gas, skall försvåra insikten.
- Om pat skall undersöka såväl gallblåsa som gallvägar gäller föreskrifterna för gallblåseundersökning.

Kontrastmedel/läkemedel

Undersökningsutförande

Undersökningen tillgår så att läkaren för ultraljudsapparatusens ljudhuvud, storlek som en rakapparat ungefär, över huden. Kontaktgel/kräm används. Patienten bör kunna inta olika kroppslägen och djupandas resp hålla andan på anmaning.

Eftervård

-