

## MRT tunntarm remittent

---

### Dosklass 0



Ingen strålrisk

### Indikation/frågeställning

Mb Crohn. Endast remiss från gastroenterolog eller kirurg.

### Kontraindikationer

#### Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

#### Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

### Remissinnehåll

Anamnes och status. Coloskopifynd, F-Calprotectin. Ileussympptom, ev. tidigare operationer/tarmresektioner.

### Patientförberedelser

Fasta 4 tim.

### Kontrastmedel

Dotarem 0,2 ml/kg.

## Läkemedel

T. Primperan 1 mg. Buscopan eller Glucagon im.

## Utförande

Patienten får dricka 1,5 liter vatten blandat med Nutilis-pulver och Sorbitol under 30-45 minuter före undersökningen. Patienten undersöks i bukläge.

## Eftervård

-