

## Palliativ munvård

### *Vid sår och smärta*

---

#### Inspektera munhålan, vad gör ont?

- Är det någon tand som gör ont?
- Sår i slemhinnan?
- Är någon tand vass och ger sår i anslutande slemhinna?
- Kontakta Folktandvårdens Folkhälsofunktionen vid osäkerhet.

#### Vid sår och smärta i munslemhinnan:

#### Lidokainhydroklorid i Oral cleaner 5mg/ml APL

*Receptbelagd, kan skrivas ut av läkare och tandläkare*

Smärtlindrande, slemlösande, rengörande och återfuktande

Finns i 300ml och 100ml (är då i en spray flaska). Används med fördel på supermjuk tandborste eller muntork (skumgummitops) och badda slemhinnan.

Om personen kan sköljas 10 ml runt i minst 2 minuter för bästa effekt.  
Kan sväljas.

## Andolex 1,5 mg/ml munsköljvätska benzydaminhydroklorid

*Receptbelagd, kan skrivas ut av tandhygienist, tandläkare och läkare*

Bensydamin bör användas med försiktighet av patienter med överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID.

Innehåller alkohol

Smärtlindrande för korttidsbehandling av smärttillstånd i munhåla och svalg

Vuxna och barn över 12 år: 15 ml under ca 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Skölj munnen eller gurgla; lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.

Kan också användas på super mjuk tandborste (TePe special care) eller muntork (skumgummitops) och bada slemhinnan.