

Datortomografi thoraxbuk remittent



Dosklass III: Extra hänsyn till strålrisk för alla åldrar.

Indikation - Frågeställning

- Tumör. Metastas. Lymfom. Stadiindelning av tumörsjukdom, eventuellt kombinerad med DT hals.
- Inflammatoriska och infektiösa tillstånd.
- Cystiska förändringar.
- Abscesser.
- Trauma.

Kontraindikationer

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.

Remissinnehåll

- Anamnes och status. Tidigare radiologiska fynd. CRP-värde. Feber? Given behandling. Tidigare genomförda operationer och vad dessa innebär anatomiskt.
- Kreatininvärde, ej äldre än 3 månader.

Patientförberedelser

- Ej fasta.
- Grön eller rosa venflon i armvecket.

Kontrastmedel/läkemedel

- Vattenlösligt jodbaserat kontrastmedel iv.
- Omnipaquelösning po. Gives på vårdavdelningen. Polikliniska patienter dricker på röntgenavdelningen.
- Frågeställningen styr under hur lång tid patienten ska dricka kontrast. Se allmän del.
- Traumafall dricker i regel ej kontrast.

(Se vidare om kontrastmedelsreaktioner i Kontrastmedelsöverkänslighet)

Utförande

Protokoll varierar med frågeställning. Även lokala variationer beroende på utrustning. Var god se på DT-bukrutin och DT thorax.

Eftervård

-